

Antiparasitario Interno

Polvo soluble

FÓRMULA:

Cada 1,000 g contiene:

Piperacina Diclorhidrato 550 g

Excipiente c.s.p. 1,000 g



laboratoriocuvita.com

ASCARICYN es un fármaco derivado de la Piperacina, efectivo contra larvas y huevos de *Ascaris* específica en el animal. La Piperacina promueve la expulsión de *Ascaris* vivos teniendo un efecto predominante sobre *Ascaris* adultos y con muy buenos resultados en todas las especies. Su método de acción se manifiesta por la producción de parálisis flácida debido al bloqueo de la acetilcolina a nivel de placa neuromuscular del parásito. Finalmente el parásito es expulsado por los movimientos propios del intestino.

ESPECIES DE DESTINO:

Aves, Porcinos, Equinos, Bovinos, Caprinos, Camélidos Sudamericanos, Ovinos, Caninos y Felinos

INDICACIONES:

Aves: *Ascaris galli* (también conocidos como gusanos fecales – *Heterakis gallinae*).

Porcino: *Ascaris Suum* (también conocido como gusano redondo grande).

Equino: *Parascaris Equorum* (Es una parasitosis provocada por un *Ascaris* algo frecuente en los equinos sobre todo en los animales de menos de 2 años; produce trastornos de tipo digestivos, cólicos y retraso en su desarrollo).

Bovino: *Toxocara Vitulorum* (*Neo-ascaris* – Nematodo gastrointestinal de mayor reproducción en regiones cálidas. Se pueden alojar en el intestino delgado, pulmones, tráquea, esófago, hígado, riñones, etc.).

Caninos y Felinos: *Toxocara canis* y *Toxocara cati* (es una infección zoonótica cosmopolita proveniente de perros y gatos respectivamente, migran erráticamente por todo el cuerpo causando reacciones inflamatorias)

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral disuelta en el agua de bebida limpia o en alimentos según las indicaciones. Preparar la solución al momento de su uso.

DOSIS:

En agua de bebida:

Aves y animales menores: 10 g en 4 litros de agua por 50 aves

Porcinos: 1 g por 5 kg de peso vivo.

Equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y bovinos: 1 gr x cada 6 kg de peso vivo.

Canino y felino: 1 g x cada 6 kg de peso vivo.

En agua alimentos:

Aves, animales menores, porcinos: Mezclar 200 g en 100 kg de alimento.

La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se ajustan de acuerdo al criterio del Médico Veterinario

ADVERTENCIAS:

No usar en aves ponedoras para consumo humano. No suministrar al ganado lechero en lactación. Preparar soluciones frescas que serán consumidas dentro de las 24 horas. Manténganse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en promedio. Usarse como se indica. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por el mal almacenamiento del producto.

PRESENTACIONES:

Caja dispensadora de 50 sobres de 10 gramos

Sobre por 100 gramos

Sobre por 500 gramos

Sobre por 1 kilogramo

ASCARICYN® es una marca registrada de



Elaborado y Distribuido por:
LABORATORIO CUVITA S.R.L.

Av. Carlos Izaguirre N°697 Lima 39 - Perú

Tel.: (51) 999 898 579

Email: ventas@laboratoriocuvita.com

Web: laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:

Dr. José E. Calderón Quiroga C.M.V. 2477

Reg. SENASA: F.08.70.N.1067