

CALCIO MDg[®]

Uso Veterinario

Calcificante, Mineralizante, Energético, Estimulante

Solución Inyectable

FÓRMULA:

Cada ml contiene:

Borogluconato de calcio	270 mg
Borogluconato de magnesio	70 mg
Dextrosa	300 mg
Fósforo elemental	5 mg
Cloruro de potasio	2 mg
Cafeína	5 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL



laboratoriocuvita.com

DESCRIPCIÓN:

Para la prevención y tratamiento de la fiebre de la leche y en casos de deficiencia de calcio, fósforo y magnesio. También en casos de cetosis, raquitismo, osteomalacia, tetania de pastos (envenenamiento por forrajes), intoxicaciones, hipofosfatemia, deficiencias en general y como tónico reconstituyente. La adición de un estimulante cardiocirculatorio ayuda a levantar rápidamente a las vacas caídas. Se utiliza en los casos de deficiencias crónicas donde es necesario elevar rápidamente los niveles de Calcio y Magnesio en la sangre, así como preventivo en vacas preñadas y lactantes. Se utiliza también como hemostático, y antianafiléctico.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, equinos, caprinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicar de preferencia por vía intravenosa; también puede usarse vía intramuscular y subcutánea, de ser necesario repetir la dosis.

Eventualmente se pueden utilizar las vías subcutánea e intramuscular. En este caso no exceder los 30 mL. por punto de aplicación.

En caso de aplicación intramuscular o subcutánea no aplicar más de 50 mL por punto de aplicación.

DOSIFICACIÓN:

Bovinos 500 - 750 mL

Equinos 250 - 500 mL

Ovinosy Caprinos 10 - 40 mL

Porcinos 50 - 100 mL

Caninos 5 - 25 mL

Felinos 5 - 15 mL

PERIODO DE RETIRO:

No existe tiempo de suspensión para carne ni leche.

REACCIONES ADVERSAS:

Se puede manifestar con muy poca frecuencia reacciones de hipersensibilidad; de ser este el caso, es necesario interrumpir el tratamiento.

La reacción local puede ocurrir en el lugar de la inyección en los animales hasta una semana después de la administración.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. Almacenar entre 15°C y 30°C. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

PRECAUCIONES:

La solución debe ser transparente y no contener precipitado. No administrar en caso contrario. Una vez abierto el frasco, desechar la porción no utilizada de la solución.

Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar. Eliminar las jeringas descartables usadas. Usarse solo como se indica.

Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto.

Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto.

PRESENTACIONES:

Frasco de: 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar en caso de insuficiencia renal cardiovascular, así como en casos de hipercalcemia. No administrar a animales hiperexcitados, ya que puede ocurrir muerte repentina.

CALCIO MDg® es una marca registrada de



Av. Carlos Izaguirre N°697 Lima 39 - Perú

Tel.: (51) 999 898 579

Email: ventas@laboratoriocuvita.com

Web: laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:

Dr. José E. Calderón Quiroga C.M.V. 2477

REG.SENASA: F.F4.01.N.0087

Email: ventas@laboratoriocuvita.com