

ENROCU 20%[®]

Uso Veterinario

Antibiótico bactericida

Solución Oral

FÓRMULA:

Cada 100 mL contiene:

Enrofloxacinina 20 g

Excipientes. c.s.p..... 100 mL



laboratoriocuvita.com

INDICACIONES:

ENROCU 20% ORAL contiene Enrofloxacinina, antibacteriano perteneciente a las fluoroquinolonas, activa contra cocos y bacilos entéricos Gram-negativos. También son activos contra *Pseudomonas aeruginosa*, *Aeromonas* y *Haemophilus*. Estos fármacos tienen una excelente actividad contra bacterias patógenas del aparato gastrointestinal incluyendo *E. Coli*, *Salmonella spp*, *Shigella spp*, *Yersinia enterocolitica*, *Campylobacter yeyuni* y *Vibrio spp*. También tienen una actividad importante contra patógenos intracelulares tales como *Brucella spp*, *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma pneumoniae* y *Mycobacterium spp*.

ESPECIES DE DESTINO:

Aves, Cerdos y Bovinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Administrar por vía oral, directamente en el pico o en el agua de bebida y acorde a la cantidad de agua que se consumirá en un periodo de 24 horas..

AVES (Pollos, gallinas y pavos): 0,05 mL (10 mg de Enrofloxacinina) del producto por kg de p.v.; durante 3 a 5 días.

CERDOS Y BOVINOS: 0,0125 - 0,025 mL (2,5 - 5,0 mg de Enrofloxacinina) del producto por kg de p.v.; durante 3 a 5 días.

La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis . se ajustan de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: 28 días.

Carne: Aves (pollos, gallinas y pavos): 10 días.

No administrar a ponedoras que se encuentren en producción de huevos para consumo humano.

No administrar en vacas en producción láctea para consumo humano.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

Constante por cada 24 horas, durante un periodo entre 3-5 días consecutivos, hasta la recuperación de los animales.

PRECAUCIONES:

No administrar en animales sensibles a Enrofloxacin. Por vía oral, la administración simultánea de sustancias que contengan magnesio, calcio y aluminio puede reducir la absorción de la Enrofloxacin.

El recipiente no tiene que estar deteriorado, ni roto. Una vez abierto el envase, descartar el producto sobrante no utilizado. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Usarse sólo como se indica.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Se recomienda diluir el producto en agua de bebida con una adecuada homogeneidad y preparar una nueva dilución cada 24 horas para garantizar la efectividad del producto.

ADVERTENCIAS:

Preparar soluciones frescas que serán consumidas dentro de las 24 horas. Manténganse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en promedio. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por el mal almacenamiento del producto.

PRESENTACIONES:

Gotero por 20 mL, Frascos x 250 mL, 500 mL, 1 L

ENROCU 20% ORAL[®] es una marca registrada de



Elaborado y Distribuido por:
LABORATORIO CUVITA S.R.L.
Av. Carlos Izaguirre N°697 Lima 39 - Perú
Tel.: (51) 999 898 579
Email: ventas@laboratoriocuvita.com
Web: laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:

Dr. José E. Calderón Quiroga C.M.V. 2477

REG.SENASA: F.82.37.N.0473