

ENROCU 10%®

Uso Veterinario

Antibiótico de Amplio Espectro

Solución Inyectable

FÓRMULA:

Cada 100 mL contiene:

Enrofloxacin.....10 g

Excipientes c.s.p..... 100 mL



laboratoriocuvita.com

DESCRIPCIÓN:

ENROCU 10%, formulado en base a Enrofloxacin, antibiótico que pertenece a la clase química de las fluoroquinolonas (tercera generación). Su formulación ejerce una actividad bactericida mediante un mecanismo de acción basado en la inhibición de la subunidad A de la ADN-girasa (Topoisomerasa II) bacteriana, impidiendo la rotación axial negativa de la molécula de ADN.

Potente antibacteriano de amplio espectro para el tratamiento y prevención de las enfermedades infecciosas producidas por bacterias Gram positivas, Gram negativas y Mycoplasmas.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, Ovinos, Caprinos, Camélidos sudamericanos, Porcinos, Caninos, Felinos y Aves.

INDICACIONES:

Bovinos Ovinos, Caprinos y Camélidos sudamericanos: Enteritis bacteriana (diarrea), actinobacilosis, leptospirosis, anaplasmosis, ántrax, heridas infectadas, metritis aguda, pедера, mastitis septicémicas, infección umbilical o articular, dermatofitosis, salmonelosis y neumonía.

Porcinos: Diarrea en lechones, Colienterotoxemia, Salmonelosis, Neumonía Enzootica, bronconeumonías, Rinitis Atrófica, Síndrome Mastitis Metritis Agalaxia (MMA) por, E. coli, Proteus spp., Pasteurella spp., Bordetella spp., Mycoplasma hyopneumoniae.

Caninos y Felinos: Infecciones del tracto digestivo, tracto urogenital, respiratorio, conducto auditivo y dermatológicas, causadas por agentes como E. coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Pausteurella multocida, Pseudomona aeruginosa, Brucella canis, Bordetella bronchiseptica; también en casos de Ehrlichia canis.

Aves: Micoplasmosis, Colisepticemia, Complejo Respiratorio Crónico, Coriza, Cólera, Salmonelosis, Estafilococosis. Como tratamiento secundario en casos de Newcastle y Bronquitis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Bovinos, Ovinos, Caprinos, Camélidos y Porcinos: (vía subcutánea o intramuscular) 1 mL/20 a 40 kg de p.v. una vez al día por 3 a 5 días.

Caninos: Para sepsis (vía endovenosa) 1 mL/5 a 20 kg de p.v. En infecciones (vía subcutánea o intramuscular) 1 mL/20 a 40 kg de p.v. cada 12 horas.

Felinos: (vía subcutánea) 0.1 mL/ 4 kg de p.v. cada 12 horas.

Aves: (vía intramuscular) 0.15 mL/kg de p.v. durante 3 a 10 días.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: 07 días; pavos: 10 días.

No administrar a ponedoras en producción de huevos para consumo humano.

No administrar a vacas en producción de leche para consumo humano.

EFFECTOS COLATERALES

- No conocidos en indicaciones y dosis terapéuticas. En determinadas especies de mamíferos ocurren lesiones renales y articulares. En caninos en crecimiento puede producir problemas en el desarrollo de los huesos largos, por inhibición del crecimiento del cartílago.
- En caninos a dosis superiores a 60 mg vía oral se observa vómito y salivación.
- En terneros dosis superiores a 30 mg/kg por 14 días origina lesiones articulares y a 60 mg/kg se puede observar lesión a nivel renal.
- La enrofloxacin es muy irritante cuando se administra por la vía intramuscular ocasionando un marcado aumento de la creatinquinasa en suero e inflamación y dolor en el sitio de inyección en algunos casos.

PRECAUCIONES:

No administrar en animales sensibles a la Enrofloxacin. No mezclar en la misma jeringa o envase con cualquier otra sustancia ajena al producto. Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto. Laboratorio CUVITA S.R.L no se responsabiliza por la mal uso del producto y las consecuencias posteriores a la aplicación.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar entre 15°C y 30°C. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

ADVERTENCIAS:

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en promedio. Laboratorio CUVITA S.R.L no se responsabiliza por el mal almacenamiento del producto. Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES:

Frasco de: 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL

ENROCU 10%[®] es una marca registrada de



Elaborado y Distribuido por:
LABORATORIO CUVITA S.R.L.

Av. Carlos Izaguirre N°697 Lima 39 - Perú

Tel.: (51) 999 898 579

Email: ventas@laboratoriocuvita.com

Web: laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:

Dr. José E. Calderón Quiroga C.M.V. 2477

REG. SENASA: F21.01.N.0036