

HIERRO MAX 12[®]

Uso Veterinario

Suplemento reconstituyente
mineral vitaminado

Solución Inyectable

FÓRMULA:

Cada ml contiene:

Hierro Dextrano 200 mg

Cianocobalamina (Vit. B12) 60 mcg

Excipientes c.s.p..... 1 mL



DESCRIPCIÓN:

Complejo antianémico de Hierro, asociado con vitamina B12 para lechones y otros animales. El Hierro está indicado para la prevención y tratamiento de anemias de tipo hipocrómico-microcítico y la vitamina B12 en las anemias macrocíticas en general. La Vitamina B12 resulta indispensable para la formación de glóbulos rojos, para el crecimiento corporal y regeneración de los tejidos. La deficiencia de esta vitamina da lugar a la llamada anemia perniciosa (palidez, cansancio, etc.). La asociación de ambos componentes es necesaria para un crecimiento normal, sano y vigoroso del animal.

La **anemia por deficiencia de hierro** es una enfermedad que afecta principalmente a los lechones debido a que estos nacen con reservas limitadas de hierro, el cual es un componente imprescindible de las células sanguíneas. La carencia de hierro durante las primeras semanas de nacido puede tener como consecuencia la disminución de la capacidad de los glóbulos rojos para absorber oxígeno, dando como resultado un cuadro de anemia en el animal.

HIERROMAX 12[®] está indicado en la prevención de cuadros de anemia, pérdida de apetito, crecimiento retardado, diarreas, resistencia disminuida contra gérmenes y condiciones climáticas variables.


ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Equinos, Camélidos sudamericanos.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar por vía intramuscular solamente.

Sitio para inyección intramuscular.



DOSIFICACIÓN:

Bovinos: 2-3 mL (adultos) • 1.75 - 2.5 mL (terneros)

Porcinos: 1 mL (lechones) a los 3 días de vida.

Ovinos: 1-2 mL (corderos)

Caprinos: 1-2 mL (cabritos)

Equinos: 1-2 mL (potros en la 1ra semana)

Camélidos: 1-2 mL (tuis)

Animales adultos: 10-20 mL

Dosis única en todas las especies.

PERIODO DE RETIRO:

No existe tiempo de suspensión para carne ni para leche.

CONTRAINDICACIONES:

Contraindicado en animales con deficiencia de vitamina E y/o selenio, ni en animales con infecciones renales agudas. No usar en asociación con suplementos de Hierro orales.

REACCIONES ADVERSAS:

Se puede manifestar con muy poca frecuencia reacciones de hipersensibilidad; si aparecieran, interrumpir el tratamiento.

La reacción local puede ocurrir en el lugar de la inyección en los animales hasta una semana después de la administración.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. Almacenar entre 15°C y 30°C. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

PRECAUCIONES:

La solución debe ser transparente y no contener precipitado. No administrar en caso contrario. Una vez abierto el frasco, desechar la porción no utilizada de la solución..

Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar. Eliminar las jeringas descartables usadas.

Usarse solo como se indica.

Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto.

Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto.

PRESENTACIONES:

Frasco de: 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL.

HIERROMAX 12[®] es una marca registrada de



Av. Carlos Izaguirre N°697 Lima 39 - Perú

Tel.: (51) 999 898 579

Email: ventas@laboratoriocuvita.com

Web: laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:

Dr. José E. Calderón Quiroga C.M.V. 2477

REG.SENASA: F.F4.01.N.0090