

IVERMEXIN FORTE L.A.

Ivermectina + Vitamina B12 (Cianocobalamina)

Uso Veterinario

Endectocida Vitaminado

FÓRMULA:

Cada 100 ml contiene:

Ivermectina 3.15 g

Vitamina B12 (Cianocobalamina) 5.0 mg

Excipientes c.s.p 100 mL



laboratoriocuvita.com

DESCRIPCIÓN:

IVERMEXIN FORTE L.A. es un antiparasitario endectocida de amplio espectro y larga acción (L.A.), el cual posee una persistente actividad en el organismo del animal dosificado. La Ivermectina potencializa el efecto de la sustancia neurotransmisora GABA en las terminaciones nerviosas, lo que interrumpe el impulso nervioso, causando parálisis y muerte del parásito. La Ivermectina tiene un amplio margen de seguridad ya que se puede aplicar una sobredosis accidental del producto sin mayores efectos en el organismo del animal. IVERMEXIN FORTE L.A. adiciona a su formulación la Vitamina B12 (Cianocobalamina), la cual actúa como coadyuvante en los diferentes estadios de anemia y convalecencia parasitaria.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, Ovinos, Caprinos y Camélidos Sudamericanos.

La ivermectina afecta en forma inversa a los peces y otros animales acuáticos. No se recomienda su uso en otras especies que no sean las autorizadas.

MARGEN DE SEGURIDAD:

Por los Estudios de estabilidad y las Pruebas de Campo se ha comprobado que IVERMEXIN FORTE L.A. es un producto seguro, no habiéndose observado ningún efecto negativo durante ni después del tratamiento. La efectividad de IVERMEXIN FORTE L.A. ha sido comprobada satisfactoriamente en los resultados obtenidos en estos estudios.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Administrar únicamente por vía subcutánea.

1 mL de IVERMEXIN FORTE L.A., equivalente a 31.5 mg de Ivermectina y 50 mcg de Vitamina B12 (Cianocobalamina), por cada 50 kg de peso vivo.

La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se ajustan de acuerdo al criterio del Médico Veterinario tratante.

PERIODO DE RETIRO:

Los animales no deben ser sacrificados para el consumo humano hasta 122 días después de haber terminado el tratamiento. No usar en productores de leche.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

IVERMEXIN FORTE L.A. es indicado en el tratamiento y control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales y pulmonares) y externas en:

BOVINOS:

Parásitos Gastrointestinales:

Haemonchus (L4-A), *Trichostrongylus (L4-A)*, *Cooperia (L4-A)*, *Nematodirus (L4-A)*, *Ostertagia (L4-Li-A)*, *Oesophagostomum (L4-A)*

Parásitos Pulmonares:

Dyctiocaulus viviparus (adultos, inmaduros y estadios inhibidos), *Dyctiocaulus filaria* (gusano del pulmón o "ichu curu").

Piojos:

Linognathus vituli, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*, *Dimalinea bovis* (piojos masticadores).

Garrapatas:

Boophilus microplus, *Ornithodoros savignyi*.

Ácaros de la sama:

Psoroptes ovis var. Bovis,

OVINOS, CAPRINOS Y CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS:

Parásitos Gastrointestinales:

Chabertia ovina (adultos, L4, L3), *Ostertagia trifurcata* (adultos, L3, L4), *Ostertagia circumcincta* (adultos, L4), *Haemonchus contortus* (adultos, L3, L4), *Nematodirus filicollis*, *Nematodirus spathiger* (L3 y L4), *Cooperia curticei* (adultos, L4), *Oesophagostomum venulosum* (adultos, L3 y L4), *Trichuris ovis* (adultos), *Strongyloides papillosus* (L3, L4), *Gaigeria pachyscelis* (adultos, L3, L4), *Trichostrongylus colubriformis* (adultos, L3, L4), *Trichostrongylus capricola* (adultos), *Trichostrongylus axei* (adultos), *Trichostrongylus vitrinus* (adultos), *Sarcoptes scabieri* y *Psoreptes communis*.

Parásitos Pulmonares:

Dyctioaulus filaria (gusano del pulmón o "ichu curu"), *Protostrongylus rufescens*.

Piojos:

Damelinea ovis, *Linognathus ovillus*, *L. pedalis*, *Microthoracius mazai*, *Dimalinea aucheniae* (piojos masticadores).

Gusanos de la nariz:

Oestrus ovis.

Ácaros de la sama:

Psoroptes ovis., *Sarcoptes scabiei var. ovis*., *Psorergates ovis*, *Sarcoptes scabiei var. aucheniae*.

CONTRAINDICACIONES: Usar solo en especies de destino mencionadas. No se recomienda su empleo en cachorros menores a 6 semanas de vida. Perros Collies o mestizos de collie y pastores muestran reacciones negativas a la Ivermectina.

SEGURIDAD:

IVERMEXIN FORTE L.A. puede ser aplicado en cualquier etapa del proceso de gestación debido a que no afecta la fertilidad ni fetos en formación; tampoco afecta el desempeño reproductivo en sementales.

TOXICIDAD:

Administrado a las dosis indicadas no produce efectos tóxicos. Los envases o cualquier residuo del producto, deben eliminarse de forma segura ya que la Ivermectina afecta de forma adversa a los peces y otros organismos acuáticos.

PRECAUCIONES:

La solución debe ser transparente, ligeramene rosada y no contener precipitado. No administrar en caso contrario. Una vez abierto el frasco, desechar la porción no utilizada de la solución. El contenido de cada envase es para un solo uso.

Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar. Eliminar las jeringas descartables usadas. Usarse solo como se indica.

Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto.

ALMACENAMIENTO:

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en promedio. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Usarse solo como se indica.

PRESENTACIONES:

Frasco de: 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

IVERMEXIN FORTE L.A. es una marca registrada de:



Fabricado y distribuido por:

LABORATORIO CUVITA S.R.L.

Av. Carlos Izaguirre N° 697, Lima 39 - Perú

Tel.: (511) 999 898 579

Email: Info@laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:

Dr. José E. Calderón Quiroga C.M.V. 2477

REG.SENASA: F.054.001.N.00335

Email: ventas@laboratoriocuvita.com