IVERMEXIN ORAL

Uso Veterinario

Antiparasitario Interno y Externo

Solución Oral

FÓRMULA:
Cada 100 mL contiene:
Ivermectina ..... 1 g
Excipientes c.s.p ..... 100 mL

LABORATORIO CUVITA
laboratoriocuvita.com

INDICACIONES:
IVERMEXIN ORAL es un producto cuyo principio activo es la Ivermectina. La Ivermectina paraliza nematodos y artrópodos, provocando su muerte como resultado de una mayor descarga del ácido gamma aminobutírico (GABA) en las terminaciones nerviosas, interrupiéndo la transmisión de los impulsos nerviosos. IVERMEXIN ORAL es efectivo para el tratamiento, control y prevención de nematodos gastrointestinales (*Heterakis sp*., *Capillaria sp*. y *Ascaridia sp*.) y ácaros (Ornithonyssus sylviarium y Dermanyssus gallinae), garrapatas del género argas, chinches de las aves, Cimex lectularius y todas las especies de piojos picadores. Como coadyuvante para el control del escarabajo Alphitobius diaperinus.
Al mismo tiempo, también reduce la población del escarabajo de la cama.

PRECAUCIONES:
La administración en dosis altas del producto puede provocar signos nerviosos.

ESPECIES DE DESTINO:
Aves.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:
Vía de administración: Oral.
AVES: 0.5 mL/L de agua de bebida o 1 mL/20-25 kg p.v. / 2 días consecutivos.
Repetir a los 7 o 15 días según criterio del Médico Veterinario tratante.
Para el control de escarabajos, la misma dosis durante 2 días en la 3era semana y 2 días en la cuarta semana de edad de las aves. Para garantizar el consumo total de la medicación, debe restringirse el agua de bebida 2 horas antes de la administración del producto.
La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se ajustan de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

PERIODO DE RETIRO:
Carne: 8 días - Huevos: 0 días

CONTRAINDICACIONES:
No administrar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a la ivermectina.

TOXICIDAD:
Administrado a las dosis indicadas no produce efectos tóxicos. Los envases o cualquier residuo del producto, deben eliminarse de forma segura ya que la Ivermectina afecta de forma adversa a los peces y otros organismos acuáticos.

PRECAUCIONES:
La solución debe ser oleosa, ligeramente amarillo, transparente y de aspecto homogéneo y libre de particulas extrañas. No administrar en caso contrario. Una vez abierto el frasco, desechar la porción no utilizada de la solución. El contenido de cada envase es para un solo uso.
Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar. Usarse solo como se indica.
Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto.
Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto.

ALMACENAMIENTO:
Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en promedio. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRESENTACIONES:
Frasco de: 20 mL, 500 mL y 1 lt.

IVERMEXIN ORAL es una marca registrada de:

LABORATORIO CUVITA

Fabricado y distribuido por:
Laboratorio CUVITA S.R.L.
Av. Carlos Izaguirre N° 697, Lima 39 - Perú
Tel.: (51) 999 898 579
Email: Info@laboratoriocuvita.com
Web: laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:
Dr. José E. Calderón Quiroga C.M.V. 2477

REG. SENASA N°: F.09.37.N.0364

VENTA BAJO RECETA MÉDICA