

Endectocida Multivitaminado

FÓRMULA:

Cada 100 ml contiene:

| | |
|--|----------------|
| Ivermectina | 1.2 g |
| Vitamina A (Palmitato de retinol) ... | 5.000.000 U.I. |
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 40.000 U.I. |
| Vitamina E (Acetato de α toferol) | 1.000 U.I. |
| Excipientes c.s.p. | 100 mL |



laboratoriocuvita.com

DESCRIPCIÓN:

IVERVIT L.A., antiparasitario endectocida de amplio espectro y larga acción (L.A.) el cual posee una persistente actividad en el organismo del animal. La asociación de Ivermectina con vitaminas liposolubles (A, D3 y E) provee una respuesta efectiva contra alteraciones metabólicas y nutricionales. Las vitaminas A, D3 y E también ayudan al mantenimiento basal y funcional del organismo animal, incorporando elementos necesarios para ello, los cuales son desbalanceados por el daño parasitario.

IVERVIT L.A., es indicado para el control de Nematodos gastrointestinales y pulmonares, piojos chupadores, ácaros de sarna y garrapatas en Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos.

La ivermectina afecta en forma inversa a los peces y otros animales acuáticos. No se recomienda su uso en otras especies que no sean las autorizadas.

MARGEN DE SEGURIDAD:

Por los Estudios de estabilidad y las Pruebas de Campo se ha comprobado que **IVERVIT L.A.** es un producto seguro, no habiéndose observado ningún efecto negativo durante ni después del tratamiento. La efectividad de **IVERVIT L.A.** ha sido comprobada satisfactoriamente en los resultados obtenidos en estos estudios.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Administrar únicamente por vía subcutánea.

Cada mL de **IVERVIT L.A.** es equivalente a 12 mg de Ivermectina, 50,000 U.I. de Vitamina A (Palmitato de retinol), 400 U.I. de Vitamina D3 (Colecalciferol), y 10 U.I. de Vitamina E (Acetato de α toferol).

Bovinos, Ovinos y Caprinos: 1 mL por cada 60 kg de peso vivo

Porcino: 1 mL por cada 40 kg de peso vivo.

PERIODO DE RETIRO:

Los animales no deben ser sacrificados para el consumo humano hasta 122 días después de haber terminado el tratamiento. No usar en productores de leche.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

IVERVIT L.A. es indicado en el tratamiento y control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales y pulmonares) y externas en:

BOVINOS: Parásitos Gastrointestinales (estadios inmaduros y adultos): *Haemonchus (L4-A)*, *Trichostrongylus (L4-A)*, *Cooperia (L 4-A)*, *Nematodirus (L4-A)*, *Ostertagia (L4, Li-A)*, *Oesophagostomum (L4-A)*. **Parásitos Pulmonares:** *Dictyocaulus (L4-A)*. **Ácaros:** *Sarcoptes bovis*. **Piojos:** *Haematopinus eurystermus*, *Lignosnatus vituli*. **Moscas:** *Haematobis irritans*.

OVINOS Y CAPRINOS: Parásitos gastrointestinales: *Haemonchus*, *Trichostrongylus*, *Cooperia*, *Nematodirus*, *Tichuris*, *Chavertia*, *Ostertagia*, *Oesophagostomum*. **Ácaros:** *Psorptes ovis*. **Larvas de moscas:** *Mallophagus ovinus*.

PORCINOS: *Oesophagostomum spp.*, *Strongyloides spp.*, *Ascaris summ*, *Hyostrogylus rubidus*, *Ascarops spp.*.

CONTRAINDICACIONES: No administrar en caso de insuficiencia renal cardiovascular, así como en casos de hipercalcemia. No administrar a animales hiperexitados, ya que puede ocurrir muerte repentina.

SEGURIDAD:

IVERVIT L.A. puede ser aplicado en cualquier etapa del proceso de gestación debido a que no afecta la fertilidad ni fetos en formación; tampoco afecta el desempeño reproductivo en sementales.

TOXICIDAD:

Administrado a las dosis indicadas no produce efectos tóxicos. Los envases o cualquier residuo del producto, deben eliminarse de forma segura ya que la Ivermectina afecta de forma adversa a los peces y otros organismos acuáticos.

PRECAUCIONES:

La solución debe ser oleosa, ligeramente amarillo, transparente y de aspecto homogéneo y libre de partículas extrañas. No administrar en caso contrario. Una vez abierto el frasco, desechar la porción no utilizada de la solución. El contenido de cada envase es para un solo uso.

Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar. Eliminar las jeringas descartables usadas. Usarse solo como se indica.

Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto.

Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto.

ALMACENAMIENTO:

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en promedio. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Usarse solo como se indica.

PRESENTACIONES:

Frasco de: 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

IVERVIT L.A. es una marca registrada de:



Fabricado y distribuido por:
Laboratorio CUVITA S.R.L.
Av. Carlos Izaguirre N° 697, Lima 39 - Perú
Tel.: (51) 999 898 579
Email: Info@laboratoriocuvita.com
Web: laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:

Dr. José E. Calderón Quiroga C.M.V. 2477