

NutriCal Coloidal®

Uso Veterinario

Calcio coloidal, Vitaminas y Minerales

Solución Inyectable

FÓRMULA:

Cada 100 mL contiene:

Cloruro de calcio	3.60 Eq
Vitamina A	7 000 000 UI
Vitamina B1	0.03 mg
Vitamina B2	0.15 mg
Vitamina B12	7.00 mg
Vitamina C	5.0 mg
Vitamina D3	1 000 000 UI
Vitamina E	500 mg
Fósforo	70 mg
Magnesio	8.50 mg
Zinc	0.30 mg
Potasio	147 mg
Sodio	43 mg
Excipientes c.s.p.	100 mL



laboratoriocuvita.com

DESCRIPCIÓN:

Indicado en bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos, equinos, porcinos, aves, cuyes y conejos en estadios carenciales agudos o crónicos de calcio, vitaminas y minerales. Mejora la producción y eficiencia reproductiva (gestación y lactancia), y actúa como coadyuvante en casos de infecciones bacterianas, virales y parasitarias. También es efectivo en el tratamiento y prevención de trastornos del metabolismo, hipocalcemia, tenia, raquitismo, osteomalacia y anemias. Disminuye el estrés, favorece la conversión alimenticia y promueve un rápido crecimiento.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicar por vía intramuscular profunda

Bovinos y equinos adultos 10-15 mL

Terneros y potrillos 5-10 mL

Ovinos, caprinos y

Camélidos sudamericanos 3 - 5 mL

Porcinos 5 mL

Aves, cuyes y conejos 0.5 - 1 mL

Tratamiento curativo: Dosis diaria

Tratamiento preventivo: Dosis interdiaria

La dosis se ajusta de acuerdo al criterio del médico veterinario tratante. Repetir la dosis cada 24 horas por 3 a 5 días de ser necesario.

PERIODO DE RETIRO:

Carne y Leche: 0 días.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. Almacenar entre 15°C y 30°C. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Aplicar cada 15 días en estados carenciales.
- Aplicar 30 días antes del servicio de parto.
- Aplicar en hembras al inicio del período de lactancia y cada 30 días.
- Aplicar en animales de engorde cada 30 días.
- Usar como complemento en desparasitación y vacunaciones.
- Como complemento en el tratamiento de lesiones (cojeras, fracturas, etc).

CONTRAINDICACIONES:

No administrar en animales con antecedentes de hiersensibilidad a algunos de sus componentes.

REACCIONES ADVESAS:

Administrado como se indica, no produce reacciones adversas.

PRECAUCIONES:

Agitar antes de usar. Utilizar la dosis recomendada y solo en las especies indicadas. No aplicar más de 10mL por punto de aplicación. La solución debe ser de color rosado blanquecino y no contener precipitado. En cuadros de hipervitaminosis por sobredosificación suspender el tratamiento y dar tratamiento sintomático.

No administrar en caso contrario. Una vez abierto el frasco, desechar la porción no utilizada de la solución.

Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar. Eliminar las jeringas descartables usadas. Usarse solo como se indica.

Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto.

Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto.

PRESENTACIONES:

Frasco de: 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL.

NutraCal Coloidal® es una marca registrada de



Av. Carlos Izaguirre N°697 Lima 39 - Perú

Tel.: (511) 999 898 579

Email: ventas@laboratoriocuvita.com

Web: laboratoriocuvita.com

VENTA BAJO RECETA MÉDICA

Profesional Responsable:

Dr. José E. Calderón Quiroga C.M.V. 2477

REG.SENASA:

Email: ventas@laboratoriocuvita.com