

Antibiótico - Antiinflamatorio

Solución Inyectable

FÓRMULA:

Cada 100 mL contiene:

Oxitetraciclina HCL	20 g
Ketoprofeno	3 g
Vehículo c.s.p.	100 mL



DESCRIPCIÓN:

OXIPLUS K es la combinación de un antibiótico de amplio espectro (Oxitetraciclina HCL) con un antiinflamatorio de última generación (Ketoprofeno) no esteroide, no abortivo. Estos dos componentes hacen una asociación con efectos antiinflamatorio, antipirético, analgésico y antibacteriano de amplio espectro.

Actúa eficazmente en infecciones locales y generales acompañadas de inflamaciones, procesos infecciosos causados por microorganismos Gram positivos, Gram negativos, Micoplasmas, algunos protozoarios y rickettsias sensibles a la Oxitetraciclina, profilaxis de infecciones luego de intervenciones quirúrgicas y ginecológicas.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos.

INDICACIONES:

Bovinos: Complejo neumónico del transporte (neumonía-fiebre de transporte), panadizo, difteria, enteritis bacteriana (diarrea), actinobacilosis, leptospirosis, anaplasmosis, antrax (carbunco), heridas infectadas, metritis agudas, pederia, mastitis septicémicas, infección umbilical/articular, dermatofitosis, en todas las infecciones no específicas e infecciones bacterianas secundarias a enfermedades víricas.

Camélidos sudamericanos, ovinos y caprinos: Neumonías, carbunco sintomático, mastitis, babesiosis, prevención de infecciones post-parto, en todas las infecciones específicas causadas por microorganismos susceptibles a la Oxitetraciclina; y en infecciones bacterianas secundarias a enfermedades víricas.

Porcinos: Enteritis bacterianas (diarrea, colibacilosis), neumonía, leptospirosis, rinitis atrofica, erysipelas, infecciones post-quirúrgicas, infección umbilical/articular. Actúa como complemento en el control de las enteritis infecciosas (diarreas de los recién nacidos, colibacilosis en los lechones) y en el síndrome MMA (mastitis-metritis-agalactia). Además en infecciones bacterianas secundarias a enfermedades víricas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Administrar vía intramuscular o subcutánea.

Bovinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Camélidos Sudamericanos: 1 mL por cada 10 kg de peso vivo como única inyección. Si bien es cierto, por la característica del producto, en la mayoría de los casos será suficiente una sola aplicación, pueden existir casos en los que se requiera una segunda aplicación 48 horas después. De no ceder, se recomienda reevaluar el diagnóstico.

En aplicaciones intramusculares y subcutáneas se aconseja que el volumen administrado por lugar de aplicación deba reducirse de acuerdo con la edad y el tamaño del animal para que en el caso de los animales más pequeños solamente se les inyecten de 1 a 4 mL por lugar de aplicación. No se debe inyectar más de 10 mL por lugar de aplicación en ganado adulto y 5 mL en cerdos, ovinos y camélidos adultos.

EFECTOS COLATERALES

La Oxitetraciclina acompañada con el Ketoprofeno no produce efectos colaterales severos; en dosis muy elevadas se puede presentar trastornos alérgicos, trastornos hematopoyéticos e hipertensión.

PRECAUCIONES:

Se aconseja no aplicar mas de 10mL en un mismo sitio. No administrar en animales sensibles a Oxitetraciclina o Ketoprofeno. No mezclar en la misma jeringa o envase con cualquier otra sustancia ajena al producto. Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto. Laboratorio CUVITA S.R.L no se responsabiliza por la mal uso del producto.

ADVERTENCIAS:

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en promedio. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domesticos. Usarse solo como se indica. Laboratorio CUVITA S.R.L no se responsabiliza por el mal almacenamiento del producto.

PERIODO DE RETIRO:

No administrar la leche de los animales tratados hasta 4 días después del último tratamiento; no la carne hasta 28 días después de su última aplicación.

PRESENTACIONES:

Frasco de: 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL.

OXIPLUS K[®] es una marca registrada de



Elaborado y Distribuido por:
LABORATORIO CUVITA S.R.L.
Av. Carlos Izaguirre N°697 Lima 39 - Perú
Tel.: (51) 999 898 579
Email: ventas@laboratoriocuvita.com
Web: laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:

Dr. José E. Calderón Quiroga C.M.V. 2477

REG. SENASA: F71.01.N.0084