

SULFATEK

Uso Veterinario

Antibacteriano - Anticoccidiano

FÓRMULA:

Cada 1ml contiene:

Sulfadiazina	200 mg
Trimetoprim	40 mg
Vitamina K	10 mg
Excipientes c.s.p	1 mL



laboratoriocuvita.com

DESCRIPCIÓN:

SULFATEK es un quimioterápico bactericida de amplio espectro a base de Sulfadiazina, Trimetoprim y Vitamina K, para el tratamiento de todo tipo de procesos infecciosos y hemorrágicos; tiene una acción prolongada de hasta por 48 horas. Es ideal para casos de infecciones de vías respiratorias superiores e inferiores (rinitis, neumonía y bronquitis), infecciones de vías urinarias, infecciones de órganos genitales de hembras y machos (cistitis, vaginitis, uretritis, nefritis, mastitis, y metritis), infecciones gastro-intestinales (diarrea neonatal y salmonelosis), disentería bacteriana, heridas y otras infecciones producidas por bacterias sensibles; además por acción de la vitamina K, controla las hemorragias producidas por dichos cuadros.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, Equinos, Porcinos, Camélidos sudamericanos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Aves, Cuyes y Conejos.

MARGEN DE SEGURIDAD:

Por los Estudios de estabilidad y las Pruebas de Campo se ha comprobado que **SULFATEK** es un producto seguro, no habiéndose observado ningún efecto negativo durante ni después del tratamiento. La efectividad de **SULFATEK** ha sido comprobada satisfactoriamente en los resultados obtenidos en estos estudios.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Bovinos: Adultos 20-30 ml, Becerros 5-15 ml, Terneros 3-5 ml. Vía endovenosa lenta e intramuscular
Equinos: Adultos: 20-30 ml. Potrillos 5-15 ml. Vía endovenosa lenta e intramuscular
Porcinos: Adultos 6-12 ml. Jovenes 1-2 ml. Vía intramuscular.
Camélidos sudamericanos: Adultos 3-5 ml. Jovenes 1-2 ml. Vía intramuscular
Ovinos y Caprinos: Adultos 3-5 ml. Jovenes 1-2 ml. Vía intramuscular
Aves, Cuyes y Conejos: Adultos 0.5-1 ml. Jovenes 0.25-0.5 ml. Vía intramuscular.

PERIODO DE RETIRO:

Bovinos y Porcinos: Carne: 10 días
Camélidos Sudamericanos, Ovinos y Caprinos: 18 días
Aves (pollos, gallinas, pavos y patos), Conejos y Cuyes: Carne: 10 días
En animales en producción de leche destinada a consumo humano: 3 días

PRECAUCIONES:

La solución debe ser transparente y no contener precipitado. No administrar en caso contrario. Una vez abierto el frasco, desechar la porción no utilizada de la solución. El contenido de cada envase es para un solo uso.

Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar. Eliminar las jeringas descartables usadas. Usarse solo como se indica.

Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto.

Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto.

ALMACENAMIENTO:

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en promedio. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Usarse solo como se indica.

PRESENTACIONES:

Frasco de: 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

SULFATEK es una marca registrada de:



Av. Carlos Izaguirre N° 697 Lima 39 - Perú
Tel.: (51) 999 898 579

Profesional Responsable:
Dr. José E. Calderón Quiroga C.M.V. 2477

REG. SENASA: