

# H-Dextran PLUS

Reconstituyente hematológico

Solución Inyectable

## FÓRMULA:

Cada ml contiene:

Hierro Dextrano .....	200 mg
Cloruro de Cobalto .....	10 mcg
Cloruro de Cobre .....	2 mg
Cianocobalamina .....	50 mcg
Excipiente c.s.p. ....	1 mL



## DESCRIPCIÓN:

Complejo antianémico de Hierro, asociado con vitamina B12 (Cianocobalamina), Cloruro de cobalto y Cloruro de Cobre para lechones y otros animales. El Hierro está indicado para la prevención y tratamiento de anemias de tipo hipocrómico-microcítico y la vitamina B12 en las anemias macrocíticas en general. La Vitamina B12 resulta indispensable para la formación de glóbulos rojos, para el crecimiento corporal y regeneración de los tejidos. La deficiencia de esta vitamina da lugar a la llamada anemia perniciosa (palidez, cansancio, etc.). El Cloruro de Cobalto ayuda en la producción de glóbulos rojos; mientras que el Cloruro de Cobre es un mineral importante para la producción de energía, tejidos conectivos y vasos sanguíneos. El Cloruro de cobre también ayuda a mantener el sistema nervioso y el sistema inmunitario. La asociación de los componentes presentes en H-Dextran PLUS es necesaria para un crecimiento normal, sano y vigoroso del animal.

La **anemia por deficiencia de hierro** es una enfermedad que afecta principalmente a los lechones debido a que estos nacen con reservas limitadas de hierro, el cual es un componente imprescindible de las células sanguíneas. La carencia de hierro durante las primeras semanas de nacido puede tener como consecuencia la disminución de la capacidad de los glóbulos rojos para absorber oxígeno, dando como resultado un cuadro de anemia en el animal.

## MARGEN DE SEGURIDAD:


Por los Estudios de estabilidad y las Pruebas de Campo se ha comprobado que H-Dextran PLUS es un producto seguro, no habiéndose observado ningún efecto negativo durante ni después del tratamiento. La efectividad de H-Dextran PLUS ha sido comprobada satisfactoriamente en los resultados obtenidos en estos estudios.

## ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Equinos, Camélidos sudamericanos.

## VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar por vía intramuscular solamente.



Sitio para inyección intramuscular

ESPECIES	DOSIS	PERÍODO
Lechones	1 mL / I.M. Ocasionalmente	1er. y 3er. día de edad Repetir a la 2nd semana
Terneros, Potros	1.5 - 3 mL / I.M.	1ra. semana de edad
Ovinos, Caprinos	1 - 2 mL / I.M.	Curativo
Camélidos sudamericanos		
Bovinos, Equinos	2 - 4 mL / I.M.	Curativo

Uso Veterinario

**PERIODO DE RETIRO:**

No existe tiempo de suspensión para carne ni para leche.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Coloración en el punto de inoculación. En ocasiones produce reacciones anafilácticas, que pueden ser graves, o reacciones más suaves, del tipo de urticaria, fiebre, cefaleas, náuseas, vómitos y linfadenopatía regional. Por eso se recomienda administrar una dosis inicial pequeña de prueba y disponer de medidas de protección antialérgica. Es más controlable la vía intravenosa, ya que se puede interrumpir la infusión tan pronto aparezcan los primeros síntomas; hay quien desaconseja por completo la vía intramuscular. Después de la administración intravenosa, cuando la velocidad de la venoclisis, es elevada, se provoca dolor y enrojecimiento del sitio de la venoclisis, dolor torácico, mareo, fatiga, taquicardia y bochornos.

**CONTRAINDICACIONES:**

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a las sustancias activas o a algún excipiente. En casos de anemia de tipo infeccioso. Contraindicado en animales con deficiencias de vitamina E y/o Selenio. En los animales con patologías hepáticas o renales. En casos de diarrea colibacilar (puede ocasionar la muerte).

**PRECAUCIONES:**

Su venta requiere receta Médica. Consulte al Médico Veterinario. Ampliamente seguro de acuerdo a la dosis y al periodo indicado. No usar en porcinos ni en otras especies en estado adultos (causa decomiso). Evitar el uso en hembras gestantes y lactantes. No administrar junto con dosis orales de hierro. En caso de presentarse reacciones alérgicas, aplique epinefrina o antihistamínicos. La empresa farmacéutica, no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del mal uso (del producto) diferente al indicado. La solución debe contener precipitado. No administrar en caso contrario. Una vez abierto el frasco, desechar la porción no utilizada de la solución.

**ALMACENAMIENTO:**

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en promedio. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Usarse solo como se indica.

**PRESENTACIONES:**

Frasco de: 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL.

H-Dextran PLUS es una marca registrada de:



Fabricado y distribuido por:

**Laboratorio CUVITA S.R.L.**

Av. Carlos Izaguirre N° 697, Lima 39 - Perú

Tel.: (51) 999 898 579

Email: [Info@laboratoriocuvita.com](mailto:Info@laboratoriocuvita.com)

Web: [laboratoriocuvita.com](http://laboratoriocuvita.com)

**Profesional Responsable:**

Dr. José E. Calderón Quiroga - C.M.V. 2477