

# LYNCOMICIN-40

Uso Veterinario

Antibacteriano lincosamida de alta eficacia

Polvo Soluble

## FÓRMULA:

Lincomicina hidrocloreuro..... 40 g

Excipientes c.s.p. .... 100 g



## DESCRIPCIÓN:

LYNCOMICIN-40, es un antibacteriano lincosamínico. Actúa inhibiendo la síntesis proteica al unirse a la subunidad 50S ribosomal. Dependiendo de la sensibilidad de los microorganismos y la concentración del antibacteriano, su actividad puede ser bactericida o bacteriostática, y es específica frente a bacterias Gram positivas tales como: estafilococos, estreptococos, estreptococos beta-hemolíticos, corinebacterias, micoplasmas, *Erysipelotrix spp*, *Brachyspira* (Serpulina) hyodysenteriae; y microorganismos anaerobios tales como *Clostridium spp* y *Bacteriodes spp*, *Fusobacterium*, *Actinomyces*, *Peptostreptococos*, y *Peptococos*.

**Pollos de engorde:** para el control de la enteritis necrótica causada por *Clostridium perfringens* y prevención de enfermedades respiratorias

**Porcino:** para el tratamiento de la Disentería porcina causada por *Brachyspira* (Serpulina) *hyodysenteriae* y control de neumonía Enzootica (micoplásmatica).

## ESPECIES DE DESTINO:

Aves y Porcinos.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral disuelta en el agua de bebida limpia o en alimentos según las indicaciones. Preparar la solución al momento de su uso. Preparar soluciones frescas que serán consumidas dentro de las 12 horas

**Porcinos** (Disentería porcina): Administrar 5 - 10 mg de lincomicina por kg de peso vivo un en mínimo de 5 días y un máximo de 10 días consecutivos (equivalentes a 30 - 60 mg de Lincomicina por litro de agua de bebida).

**Aves:** Administrar 3.0 - 6.0 mg por kg peso vivo durante 7 días consecutivos (equivalentes a 17 mg de Lincomicina por litro de agua de bebida).

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para evitar una dosificación insuficiente.

La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se ajustan de acuerdo al criterio del Médico Veterinario tratante.

El consumo de agua depende de la situación clínica del animal y de la época del año. Para asegurar una dosificación correcta, la concentración de Lincomicina en el agua, se ajustará teniendo en cuenta el consumo diario.

## PERIODO DE RETIRO:

Carne: Cerdo: 6 días.

Pollo: 2 días.

No administrar en aves de postura cuyos huevos se destinan al consumo humano.

**Utilización durante la gestación, la lactancia o la puesta:** La lincomicina se excreta en leche, por lo que no debe usarse durante la lactación.

### **REACCIONES ADVERSAS:**

Se han observado de forma ocasional diarreas y/o inflamación leve e irritación del ano y/o vulva; estos síntomas suelen ser transitorios. En raras ocasiones, los cerdos pueden presentar enrojecimiento de la piel y comportamiento irritable. Estos signos normalmente disminuyen en los 5 a 8 días posteriores a la interrupción del tratamiento.

### **PRECAUCIONES:**

La solución debe ser transparente y no contener precipitado. No administrar en caso contrario. Una vez abierto el frasco, desechar la porción no utilizada de la solución. No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a las lincosamidas. No mezclar en el mismo envase con cualquier otra sustancia ajena al producto. Conserve las indicaciones de asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por la mal uso del producto y las consecuencias posteriores a la dosificación.

### **ALMACENAMIENTO:**

Manténganse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15°C y no más de 25°C en promedio. Usarse como se indica. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por el mal almacenamiento del producto.

### **PRESENTACIONES:**

Caja dispensadora de 50 sobres de 10 gramos, Sobre por 50 gramos, Sobre por 100 gramos  
Sobre por 500 gramos, Sobre por 1 kilogramo, Bolsa por 5 kilogramos.

LINCOMICYN-40 es una marca registrada de:



Fabricado y distribuido por:

**Laboratorio CUVITA S.R.L.**

Av. Carlos Izaguirre N° 697, Lima 39 - Perú

Tel.: (51) 999 898 579

Email: [Info@laboratoriocuvita.com](mailto:Info@laboratoriocuvita.com)

Web: [laboratoriocuvita.com](http://laboratoriocuvita.com)

### **Profesional Responsable:**

Dra. Susana Terrones Gil - C.M.V. 15102

VENTA BAJO RECETA MEDICA

Reg. SENASA: F.82.25.N.0579