

TILOBIOT-D

Uso Veterinario

Antibiótico de amplio espectro y mucolítico expectorante

Polvo soluble

FÓRMULA:

Cada 1000 g contiene:

Doxiciclina	200.0 g
Tilosina Tartrato	50.0 g
Bromhexina	5.0 g
Excipientes c.s.p.	1000.0 g



TILOBIOT-D es una asociación antibiótica bacteriostática aditiva de amplio espectro, indicado para el tratamiento y prevención de un gran número de enfermedades producidas por bacterias sensibles a la Doxiciclina y Tilosina, asociado con la Bromhexina, con acción mucolítica que normaliza la producción de moco y facilita su expectoración.

La doxiciclina es una tetraciclina con acción bacteriostática contra muchas bacterias gram positivas y negativas como *E. coli*, *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Haemophilus*, *Bordetella*, *Pasteurella*, *Campylobacter* y *Salmonella spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Rickettsia* y *Chlamydia spp.* La acción de la doxiciclina se basa en la inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas. La doxiciclina tiene una gran afinidad por los pulmones, una rápida absorción y larga vida plasmática (por su lenta excreción) por lo tanto es especialmente útil para el tratamiento de infecciones respiratorias bacterianas. La tilosina es un antibiótico macrólido de acción bacteriostática contra bacterias gram positivas como *Staphylococcus* y *Streptococcus spp.* y contra *Mycoplasma* y *Campylobacter spp.* Tras la administración oral se logran niveles sanguíneos terapéuticos después de 2 a 4 horas. La combinación presenta un amplio efecto aditivo, gran seguridad en su uso y poca posibilidad de generación de resistencia.

INDICACIONES:

Aves: enfermedad respiratoria crónica y de micoplasmosis, Coriza infecciosa, Clostridiasis y Clamidirosis. También en el tratamiento de enteritis necrótica

Porcino: Infecciones respiratorias y en las complicaciones de enfermedades virales. Tratamiento y prevención de la enteropatía proliferativa (ileítis).

Terneros y Pre-rumiantes: Infecciones respiratorias. Tratamiento y prevención de la neumonía asociada con micoplasma respiratorio.

TILOBIOT D es también indicado en la prevención de infecciones bacterianas secundarias consecutivas a infecciones virales, condiciones de estrés, vacunaciones, realojamiento, corte de pico, transporte, cambios de alimentación y clima.

ESPECIES DE DESTINO:

Aves (pollos, ponedoras, gallos, patos y pavos) y Porcinos. Prerumiantes: Bovinos (terneros) Ovinos (corderos), Caprinos (cabritos) y Camélidos sudamericanos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Vía oral disuelta en el agua de bebida limpia o en alimentos según las indicaciones. Preparar la solución al momento de su uso. Preparar soluciones frescas que serán consumidas dentro de las 12 horas

Aves y Porcinos: *Preventivo:* 1 kg del producto en 2000 L de agua de bebida o 1 kg del producto por TM de alimento; durante 3-5 días. *Curativo:* 1 kg del producto en 1000 - 1500 L de agua de bebida o 1 kg del producto en 500 - 750 kg de alimento durante 3-5 días.

Terneros, Ovinos, Caprinos, Camélidos sudamericanos: *Terapéutico:* 1 gr del producto por 10 kg de peso vivo; (en agua, leche o alimento) durante 4-5 días consecutivos. *Preventivo:* Mitad de dosis.

La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se pueden ajustar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario tratante. Cualquier factor que afecte el consumo podría modificar los niveles de efectividad del producto.

PERIODO DE RETIRO:

Pollos de engorde (Carne): 5 días / Pavos (Carne): 12 días / No usar en aves cuyos huevos sean destinados para consumo humano.

Porcinos: Carne: 5 días

Terneros: Carne: 16 días

ADVERTENCIAS:

No usar en aves ponedoras para consumo humano, ni en un plazo de 4 semanas desde el inicio de la puesta.

No usar en producto en equinos.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar con penicilinas, cefalosporinas, quinolonas y cicloserina ni aminoglucósidos.

No administrar a animales con insuficiencia hepática grave y/o daños renales.

Evitar en animales con historial de hipersensibilidad a tilosina, macrólidos y tetraciclinas.

Prohibido usarse en el periodo de puesta de huevos.

No administrar por otra vía que no sea la indicada.

ALMACENAMIENTO:

Manténganse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15°C y no más de 25°C en promedio. Usarse como se indica. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por el mal almacenamiento del producto.

MECANISMO DE ACCIÓN

La doxiciclina tiene una gran afinidad por los pulmones una rápida absorción y larga vida plasmática (por su lenta excreción)- por lo tanto es especialmente útil para el tratamiento de infecciones respiratorias bacterianas. La tilosina es un antibiótico macrólido de acción bacteriostática contra bacterias gram positivas como *Staphylococcus* y *Streptococcus spp.* y contra *Mycoplasma* y *Campylobacter spp.* Tras la administración oral se logran niveles sanguíneos terapéuticos después de 2 a 4 horas. La combinación presenta un amplio efecto aditivo, gran seguridad en su uso y poca posibilidad de generación de resistencia.

PRESENTACIONES:

Caja dispensadora de 50 sobres de 10 gramos, Sobre por 50 gramos, Sobre por 100 gramos, Sobre por 500 gramos, Sobre por 1 kilogramo, Bolsa por 5 kilogramos.

TILOBIOT-D es una marca registrada de:



Fabricado y distribuido por:

Laboratorio CUVITA S.R.L.

Av. Carlos Izaguirre N° 697, Lima 39 - Perú

Tel.: (51) 999 898 579

Email: Info@laboratoriocuvita.com

Web: laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:

Dra. Susana Terrones Gil - C.M.V. 15102

Reg. SENASA: F.82.26.N.0464

VENTA BAJO RECETA MEDICA