

TILOBIOT

Uso Veterinario

Antibiótico de amplio espectro

Polvo soluble

FÓRMULA:

Cada 100 g contiene:

Tilosina Tartrato	5.0 g
Oxitetraciclina HCL	10.0 g
Excipientes c.s.p.	100.0 g



INDICACIONES:

Antibiótico de amplio espectro efectivo frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas del género *Chlamydia* y Enterobacterias; en aves, porcinos, bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos.

Aves: Enfermedad respiratoria crónica causada por *Mycoplasma gallisepticum*, coriza infecciosa (moquillo), cólera aviar, bronquitis y sinusitis, colibacilosis, sinovitis.

Porcinos: *Pasteurella multocida*, Leptospirosis porcina y en la prevención y control de neumonía y disentería porcina.

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: Diarrea bacilar o colibacilosis causada por bacteria *Escherichia Coli*. *Histophilus somni*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma bovis*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Vía oral disuelta en el agua de bebida limpia o en alimentos según las indicaciones. Preparar la solución al momento de su uso. Preparar soluciones frescas que serán consumidas dentro de las 12 horas

Uso Preventivo:

Aves y conejos: 10 g en 8 Lt de agua durante 5 días.

Porcinos, ovinos y camélidos sudamericanos: 10 g en 8 Lt de agua durante 5 días.

Bovinos: 2 g por cada 40 kg de peso vivo durante 5 días.

Uso Curativo:

Aves: 10 g en 4 Lt de agua durante 5 días.

Porcinos, ovinos y camélidos sudamericanos: 10 g en 4 Lt de agua durante 5 días.

Bovinos: 2 g por cada 20 kg de peso vivo durante 5 días.

La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se pueden ajustar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario tratante. Cualquier factor que afecte el consumo podría modificar los niveles de efectividad del producto.

INSTRUCCIONES:

Disolver el contenido según las indicaciones en agua limpia o en alimentos. La mezcla se realiza de manera diaria. Para mejores resultados el agua dosificada y los alimentos debe ser consumidos antes de las 12 horas posteriores a la preparación.

ESPECIES DE DESTINO:

Aves (pollos, ponedoras, gallos, patos y pavos), Porcinos, Bovinos, Ovinos, Caprinos y Camélidos sudamericanos.

ADVERTENCIAS:

No usar en aves ponedoras para consumo humano, ni en un plazo de 4 semanas desde el inicio de la puesta. No suministrar al ganado lechero en proceso de lactación.

Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por el mal almacenamiento del producto.

PERIODO DE RETIRO:

Bovinos: Carne: 5 días - Leche: 21 días.

Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: Carne: 5 días

Aves: 5 días

Cerdos: 3 días

PRECAUCIONES:

No administrar en aves productoras de huevos para consumo humano. No usar en un plazo de 4 semanas desde el inicio de la puesta.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar con penicilinas, cefalosporinas, quinolonas y cicloserina ni aminoglucósidos.

No administrar a animales con insuficiencia hepática grave y/o daños renales.

Evitar en animales con historial de hipersensibilidad a tilosina, macrólidos y tetraciclinas.

Prohibido usarse en el periodo de puesta de huevos.

No administrar por otra vía que no sea la indicada.

MECANISMO DE ACCIÓN

Sinergia antimicrobiana: Al bloquear simultáneamente las subunidades 50S (tilosina) y 30S (oxitetraciclina), se paraliza el aparato de síntesis proteica de la bacteria en dos pasos críticos distintos.

Espectro ampliado: La mezcla cubre de forma eficaz tanto bacterias Gram-positivas como Gram-negativas, además de microorganismos atípicos como micoplasmas (*Mycoplasma* spp.), muy comunes en aves y cerdos.

Efecto local y sistémico oral: Administrada por vía oral (en el agua de bebida o el alimento), actúa directamente frente a infecciones gastrointestinales y logra absorción intestinal para combatir procesos respiratorios o sistémicos susceptibles en animales de producción.

ALMACENAMIENTO:

Manténganse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15°C y no más de 30°C en promedio. Usarse como se indica. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por el mal almacenamiento del producto.

PRESENTACIONES:

Caja dispensadora de 50 sobres de 10 gramos, Sobre por 50 gramos, Sobre por 100 gramos, Sobre por 500 gramos, Sobre por 1 kilogramo, Bolsa por 5 kilogramos.

TILOBIOT es una marca registrada de:



Fabricado y distribuido por:

Laboratorio CUVITA S.R.L.

Av. Carlos Izaguirre N° 697, Lima 39 - Perú

Tel.: (51) 999 898 579

Email: Info@laboratoriocuvita.com

Web: laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:

Dra. Susana Terrones Gil - C.M.V. 15102

Reg. SENASA: F.082.026.N.00704

VENTA BAJO RECETA MEDICA