

VERMINEX ULTRA

Fasciolicida, nematocida y tenicida con efecto energizante

Suspensión Oral

FÓRMULA:

Cada 100mL contiene:

Rafoxanide	10.0 g
Fenbendazol	10.0 g
Sulfato de Cobre	0.1 g
Cobalto	0.1 g
Sulfato de Zinc	3.0 g
Metionina	0.7 g
Lisina	0.47 g
Excipientes c.s.p.	100.0 ml



ESPECIES DE DESTINO:

Bovinos, caprinos, ovinos y camélidos sudamericanos.

INDICACIONES: VERMINEX ULTRA, antihelmíntico oral de amplio espectro indicado para:

Control y tratamiento de las formas adultas y juveniles de *Fasciola hepática* (formas agudas, sub-agudas y crónicas) y nematodos gastrointestinales y pulmonares de ganado bovino, ovino, caprino y camélido sudamericano.

Posee gran poder ovicida y es eficaz contra larvas arrestadas o inhibidas (hipobioticas) de *Ostertagia* spp resistentes.

Incluye en su fórmula micro elementos como Cobre, Zinc, Metionina y lisina, estimula y mantiene las funciones orgánicas, previene anemia y mejora el nivel reproductivo.

Tremátodos en bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos

Fasciola hepática (formas inmaduras y adultas), *Fasciola gigantica* (formas inmaduras y adultas)

Fascioloides magna.

Nematodos en bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos

Haemonchus placei, *Ostertagia ostertagi* (inclusive larvas inhibidas), *Ostertagia lyrata*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus columbriformis* (inclusive larvas inhibidas), *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Nematodirus helvetianus*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Trichuris ovis*. *Chabertia ovina*, *Lamanema chavezii*, *Graphinema aucheniae*, *Dyctiocaulus* sp. *Oestrus ovis*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra unicamente por vía oral.

Bovinos, Ovinos, Caprinos y Camélidos Sudamericanos: 1 mL por cada 10 kg de peso vivo (equivalente a: 0.1 g de rafoxanide + 0.1 g de fenbendazole + 0.001 de sulfato de cobre + 0.001 g de cobalto + 0.007 g de metionina + 0.03 g de sulfato de zinc + 0.0047 g de lisina por 1 kg de peso vivo).

Tabla de dosificación:

PESO VIVO kg	DOSIS (mL)	Con 1 L de VERMINEX ULTRA puede dosificar la cantidad de:
20	2.0	500 animales
30	3.0	333 animales
50	5.0	200 animales
120	12.0	83 animales
150	15.0	66 animales
200	20.0	50 animales
300	30.0	33 animales
400	40.0	25 animales

Uso Veterinario

Es necesaria una sola dosis para la efectividad del producto (dosis unica). Utilizar el fármaco de acuerdo a la incidencia de parásitos o sugerencia del médico veterinario tratante.

Administrar antes y después de las lluvias (como mínimo). En ganado de engorde administrar antes del inicio de ciclo de engorde.

INTERVALO ENTRE DOSIS: Una sola dosis.

En infestaciones severas repetir la desparasitación a los 15 a 21 días para romper el ciclo biológico del parásito y/o a criterio del Médico Veterinario.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: 28 días

Leche: No administrar en animales en producción de leche para consumo humano.

No administrar a vacas en los primeros 45 días de gestación o hasta 45 días después de haber retirado los toros del servicio.

No administrar a ovejas en los primeros 45 días de gestación o hasta 45 días después de haber retirado los carneros del servicio.

Trátase durante el período seco.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU USO:

No administrar a pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Administrar el producto solo por la vía de administración indicada. No se recomienda su uso en otras especies que no sean las autorizadas.

De presentar reacción alérgica, suspender la medicación y consultar con el médico veterinario.

Usar envases limpios para su dosificación

Romper el envase para evitar que se vuelva a usar.

RECOMENDACIONES: En rumiantes se recomienda antes de la ingesta de las pasturas.

ADVERTENCIAS: No utilizar en hembras preñadas durante los dos primeros meses de gestación.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

Programa de Dosificación Integral:

Sierra: Después de las lluvias (Abril- Mayo) y antes de las lluvias (Septiembre y Octubre).

Costa: Cada 4 meses.

Animales de engorde: Antes del inicio del ciclo de engorde.

ALMACENAMIENTO: Manténgase en un lugar fresco y seco. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en promedio. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Usarse solo como se indica.

MARGEN DE SEGURIDAD: Altamente seguro, si se administra en la dosis recomendada. Las combinaciones de los tres (03) principios activos presentan un amplio efecto aditivo, gran seguridad en su uso y poca posibilidad de generación de resistencia. Tiene un margen de seguridad hasta diez (10) veces la dosis recomendada.

CONTRAINDICACIONES:

- No se ha reportado contraindicaciones ni limitaciones en la dosis recomendada.
- El producto es muy bien tolerado por su baja toxicidad en mamíferos.
- No administrar conjuntamente con los derivados bromados de la salicilamidilida.
- No se recomienda en animales debilitados ni en situaciones de stress intenso.
- No utilizar en vacas lecheras en producción para consumo humano.

PRESENTACIONES:

Jeringa de 30 mL, Sachet de 40 mL, Frasco de: 250 mL, 500 mL, 1 lt.

VERMINEX ULTRA es una marca registrada de:



Fab. y distribuido por: **Laboratorio CUVITA S.R.L.**
Av. Carlos Izaguirre N° 697, Lima 39 - Perú
Tel.: (51) 999 898 579
Email: Info@laboratoriocuvita.com
Web: laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:

Dra. Susana Terrones Gil - C.M.V. 15102