

VIGORMAX ATP

SUPLEMENTO RECONSTITUYENTE

Solución Inyectable

FÓRMULA:

Cada ml contiene:

Adenosin trifosfato (ATP): 1 mg
Glicerofosfato de sodio: 20 mg
Cianocobalamina: 0.012 mg
Cobalto acetate: 0.5 mg
Tryptófano: 25 mg
Histidina: 5 mg
Metionina: 10 mg
Hierro (Citrate amoniacal): 20 mg
Cacodilato de sodio: 30 mg
Tiamina Clorhidrato: 5 mg
Riboflavina 5 fosfato: 2 mg
Nicotinamida: 50 mg
Piridoxina clorhidrato : 10 mg
Expediente c.s.p.: 1 mL



Uso Veterinario

DESCRIPCIÓN:

Complejo hematínico, reconstituyente y tónico general en solución inyectable. Combina diversos elementos hematopoyéticos, estimulantes del apetito, oligoelementos, antianémicos, aminoácidos, vitaminas, hepatoprotectores e incluye fósforo en su formulación (bajo la forma de glicerofosfato de sodio; lo cual le agrega una acción tonificante y estimulante del metabolismo mucho más pronunciada), así como una gama completa de vitaminas del complejo B.

INDICACIONES:

Prevención y tratamiento de todo tipo de trastornos de la hematopoyesis, anemias de origen alimenticio, infeccioso, parasitario, o post-hemorragico, entre otras. Tónico y reconstituyente general de los trastornos del metabolismo: debilidad y enflaquecimiento por alimentación deficiente; agotamiento por trabajo excesivo y por alta producción; inapetencia; convalecencia de enfermedades parasitarias, infecciosas; intoxicaciones; fracturas; agotamiento sexual; caída del pelo y otros trastornos de la piel; trastornos de la fecundidad; entre otros.

Potente estimulante del apetito, estimulante del crecimiento y de la producción de leche, carne, lana e ideal para la preparación de animales para el deporte y la exposición. Específico en el tratamiento de las enfermedades producidas por protozoos hemáticos (Anaplasmosis, Piroplasmosis).

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

ESPECIES	DOSIS *	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Bovinos (de 360 kg a 500 kg)	10 a 12 mL	I.M., S.C., E.V.
Equinos (de 360 kg a 500 kg)	10 a 12 mL	I.M., S.C., E.V.
Terneros (de 40 kg a 360 kg)	5 a 10 mL	I.M., S.C.
Potrillos (de 40 kg a 360 kg)	5 a 10 mL	I.M., S.C.
Camélidos sudamericanos	5 mL	I.M., S.C.
Ovinos y Caprinos	5 mL	I.M., S.C.
Porcinos:		
de 2 kg a 10 kg	1 mL	I.M., S.C.
de 10 kg a 20 kg	2 mL	I.M., S.C.
de 20 kg a 50 kg	5 mL	I.M., S.C.
Mayor a 50 kg	10 mL	I.M., S.C.
Aves y Cuyes	0.5 mL/2.5 de p.v.	S.C.

Cantidades de cada principio activo expresados en unidades de peso:

Cada mL de **VIGORMAX ATP** contiene:

Adenosin trifosfato (ATP): 1 mg
Glicerofosfato de sodio: 20 mg
Cianocobalamina: 0.012 mg
Cobalto acetate: 0.5 mg
Tryptófano: 25 mg
Histidina: 5 mg
Metionina: 10 mg
Hierro (Citrate amoniacal): 20 mg
Cacodilato de sodio: 30 mg
Tiamina Clorhidrato: 5 mg
Riboflavina 5 fosfato: 2 mg
Nicotinamida: 50 mg
Piridoxina clorhidrato : 10 mg

La dosis se podrían ajustar de acuerdo al criterio del médico veterinario tratante.

En especies mayores, el tratamiento completo consiste en una serie de 5 dosis, una cada tres días. En casos graves aplicarlo diariamente hasta finalizar el tratamiento completo o a criterio del médico veterinario tratante.

En trastornos leves o para preparar animales para exposición o deportes se puede administrar una dosis dos veces por semana.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: Ninguno

Leche: Ninguno

REACCIONES ADVERSAS:

- Se puede manifestar on muy poca frecuencia reacciones de hipersensibilidad; si apareciera, interrumpir el tratamiento.
- La reacción local (inchazón) puede ocurrir en el lugar de la inyección en los animales hasta una semana después de la administración.
- Durante la administración intravenosa puede presentar shock. En este caso se suspenderá la medicación y se tomarán las medidas apropiadas.
- Se pueden producir reacciones adversas que no están específicamente relacionadas con el producto sino con la nutrición parenteral en general, especialmente al principio de la nutrición parenteral.
- Pueden aparecer signos de dolor y vómitos si se administra a una velocidad de la administración excesivamente rápida. En ese caso se debe suspender la administración hasta que desaparezcan los signos luego podrá reiniciar la administración en forma lenta.

ALMACENAMIENTO:

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. La temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 30°C en promedio. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Usarse solo como se indica.

PRESENTACIONES:

Frasco de: 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL.

VIGORMAX ATP es una marca registrada de:



Fabricado y distribuido por:

Laboratorio CUVITA S.R.L.

Av. Carlos Izaguirre N° 697, Lima 39 - Perú

Tel.: (51) 999 898 579

Email: Info@laboratoriocuvita.com

Web: laboratoriocuvita.com

Profesional Responsable:

Dra. Susana Terrones Gil - C.M.V. 15102

VENTA BAJO RECETA MÉDICA

SENASA Reg.: F.107.001.N.00176